

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Cáncer de próstata

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Cáncer de próstata

Olaparib

Olaparib está indicado: - como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos concáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) y mutaciones BRCA1/2 (línea germinaly/o somática) que han progresado trasterapia previa que incluyera un nuevo agente hormonal. - en combinación con abiraterona y prednisona o prednisolona para el tratamiento de pacientes adultos con CPRCmen los que la quimioterapia no está indicada a juicio del clínico.

 **SIN FINANCIACIÓN**

 **ESMO**

Abiraterone

Abiraterone está indicado con prednisona o prednisolona para: - el tratamiento en hombres adultos del cáncer de próstata hormonosensible metastásico de nuevo diagnóstico de alto riesgo (CPHSm) en combinación con tratamiento de deprivación de andrógenos (TDA) - el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) en hombres adultos que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada - el tratamiento del CPRCm en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o tras un régimen de quimioterapia basado en docetaxel.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Enzalutamide

Enzalutamide está indicado: - en monoterapia o en combinación con la terapia de privación de andrógenos para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata hormonosensible no metastásico (CPHSnm) con recurrencia bioquímica (RBQ) de alto riesgo que no son candidatos a radioterapia de rescate. - en combinación con la terapia de privación de andrógenos para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm). - para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo. - para el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso de la terapia de privación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. - para el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Apalutamide

Apalutamide está indicado: - en hombres adultos para el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (CPRC-nm) con alto riesgo de desarrollar metástasis. - en hombres adultos para el tratamiento del cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm) en combinación con tratamiento de privación androgénica (TDA).

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Darolutamide

Darolutamide está indicado para el tratamiento de hombres adultos con - cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (CPRCnm) con alto riesgo de desarrollar cáncer con enfermedad metastásica. - cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm) en combinación con docetaxel y terapia de privación de andrógenos.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Cabazitaxel

Cabazitaxel en combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastático resistente a la castración, tratados anteriormente con una pauta terapéutica conteniendo docetaxel.

 **FINANCIACIÓN
COMPLETA**

 **ESMO**