

## Lista de terapias

**Frase de búsqueda:** Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

### Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

<b>Regorafenib</b>	Regorafenib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) que hayan sido previamente tratados con sorafenib.	 <b>SIN FINANCIACIÓN</b>  <b>ESMO</b>
<b>Cabozantinib</b>	Cabozantinib está indicado como monoterapia para el tratamiento del carcinoma hepatocelular (CHC) en adultos que han sido tratados previamente con sorafenib.	 <b>SIN FINANCIACIÓN</b>  <b>ESMO</b>
<b>Ramucirumab</b>	Ramucirumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular avanzado o no resecable que tienen una alfafetoproteína sérica (AFP) $\geq$ 400 ng/ml y que han sido previamente tratados con sorafenib.	 <b>SIN FINANCIACIÓN</b>  <b>ESMO</b>
<b>Lenvatinib</b>	Lenvatinib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no han recibido tratamiento sistémico previo.	 <b>RESTRICCIONES</b>  <b>ESMO</b>
<b>Atezolizumab</b>	Atezolizumab, en combinación con bevacizumab, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no ha recibido terapia sistémica previa.	 <b>RESTRICCIONES</b>  <b>ESMO</b>

## Pembrolizumab

Pembrolizumab, en combinación con gemcitabina y cisplatino, está indicado para el tratamiento de primera línea en adultos con carcinoma de vías biliares (CVB) localmente avanzado irreseccable o metastásico.

Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de los siguientes tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI -H, por sus siglas en inglés) o con deficiencia del sistema de reparación de apareamientos erróneos (dMMR, por sus siglas en inglés) en adultos con cáncer gástrico, de intestino delgado o biliar, irreseccable o metastásico que ha progresado durante o después de al menos un tratamiento previo.

 **FINANCIACIÓN  
COMPLETA**

 **ESMO**

## Durvalumab

Cáncer de vías biliares (CVB) Durvalumab en combinación con gemcitabina y cisplatino está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con cáncer de vías biliares (CVB) irreseccable o metastásico. Carcinoma hepatocelular (CHC) Durvalumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irreseccable. Durvalumab en combinación con tremelimumab está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irreseccable.

 **FINANCIACIÓN  
COMPLETA**

 **ESMO**