

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

Regorafenib	Regorafenib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) que hayan sido previamente tratados con sorafenib.	 SIN FINANCIACIÓN  ESMO
Cabozantinib	Cabozantinib está indicado como monoterapia para el tratamiento del carcinoma hepatocelular (CHC) en adultos que han sido tratados previamente con sorafenib.	 SIN FINANCIACIÓN  ESMO
Ramucirumab	Ramucirumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular avanzado o no resecable que tienen una alfafetoproteína sérica (AFP) \geq 400 ng/ml y que han sido previamente tratados con sorafenib.	 SIN FINANCIACIÓN  ESMO
Lenvatinib	Lenvatinib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no han recibido tratamiento sistémico previo.	 RESTRICCIONES  ESMO
Atezolizumab	Atezolizumab, en combinación con bevacizumab, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no ha recibido terapia sistémica previa.	 RESTRICCIONES  ESMO

Pembrolizumab

Pembrolizumab, en combinación con gemcitabina y cisplatino, está indicado para el tratamiento de primera línea en adultos con carcinoma de vías biliares (CVB) localmente avanzado irreseccable o metastásico.

Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de los siguientes tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI -H, por sus siglas en inglés) o con deficiencia del sistema de reparación de apareamientos erróneos (dMMR, por sus siglas en inglés) en adultos con cáncer gástrico, de intestino delgado o biliar, irreseccable o metastásico que ha progresado durante o después de al menos un tratamiento previo.



**FINANCIACIÓN
COMPLETA**



ESMO

Durvalumab

Cáncer de vías biliares (CVB) Durvalumab en combinación con gemcitabina y cisplatino está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con cáncer de vías biliares (CVB) irreseccable o metastásico. Carcinoma hepatocelular (CHC) Durvalumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irreseccable. Durvalumab en combinación con tremelimumab está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irreseccable.



**FINANCIACIÓN
COMPLETA**



ESMO