



Lista de terapias

Frase de búsqueda: Mieloma múltiple y neoplasias de células plasmáticas

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Mieloma múltiple y neoplasias de células plasmáticas

Elotuzumab está indicado en combinación con lenalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo. Elotuzumab está indicado en SIN FINANCIACIÓN combinación con pomalidomida y dexametasona para el **Elotuzumab** tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que han recibido al menos dos tratamientos previos incluyendo lenalidomida y un inhibidor del proteosoma y que han demostrado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. Ixazomib, en combinación con lenalidomida y SIN FINANCIACIÓN dexametasona, está indicado para el tratamiento de **Ixazomib** pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibido **ESMO** al menos una terapia previa. Linvoseltamab está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido al menos 3 SIN FINANCIACIÓN **Linvoseltamab** tratamientos previos, incluidos un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.

Belantamab mafodotin

Belantamab mafodotina está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de mieloma múltiple en recaída o refractario: - en combinación con bortezomib y dexametasona en pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo, y - en combinación con pomalidomida y dexametasona en pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo incluyendo lenalidomida.





Pomalidomide en combinación con bortezomib y dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibido al menos un tratamiento previo, incluyendo lenalidomida.

pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibi al menos un tratamiento previo, incluyendo lenalidomida Pomalidomide en combinación con dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento.

RESTRICCIONES



Pomalidomide

Ibrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido al menos un tratamiento previo, o en tratamiento de primera línea en pacientes en los que la inmuno-quimioterapia no se considera apropiada. Ibrutinib en combinación con rituximab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con MW.

RESTRICCIONES



Carfilzomib

Ibrutinib

Carfilzomib en combinación con daratumumab y dexametasona, con lenalidomida y dexametasona o con dexametasona sola está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido como mínimo un tratamiento previo.





Mieloma múltiple Daratumumab está indicado: - en combinación con lenalidomida y dexametasonao con bortezomib, melfalán y prednisona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que no son candidatos a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. - en combinación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico. - en combinación con bortezomib, talidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que son candidatos a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. - en combinación con lenalidomida y dexametasona, o bortezomib y dexametasona, para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo. - en combinación con pomalidomida y

Daratumumab

con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo. - en combinación con pomalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido un tratamientoprevioconteniendo un inhibidor del proteasoma y lenalidomida y fuesenrefractariosa lenalidomida, o que hanrecibido al menos dos tratamientosprevios queincluyanlenalidomida y un inhibidor del proteasomay hayan presentado progresiónde la enfermedad durante o después del último tratamiento. - en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario al tratamiento, que hayan recibido previamente un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. Mieloma múltiple quiescente Daratumumab monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple quiescente con alto riesgo de desarrollar mieloma múltiple.

RESTRICCIONES



pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que han recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y un inhibidor del proteosoma y han demostrado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. - en combinación con carfilzomib y dexametasona, para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo. - en combinación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona, para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de

nuevo diagnóstico que no son elegibles para trasplante

autólogo de células madre.

Isatuximab está indicado: - en combinación con

pomalidomida y dexametasona, para el tratamiento de





Isatuximab

Selinexor

dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que han recibido al menos un tratamiento previo; - en combinación con dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que han recibido al menos cuatro tratamientos y cuya enfermedad es resistente al menos a dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que han presentado evolución de la enfermedad en el último tratamiento.

Selinexor está indicado: - en combinación con bortezomib y

- RESTRICCIONES
- S ESMO

Idecabtagene vicleucel

Idecabtagene vicleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido al menos dos tratamientos previos, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteosoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.

- RESTRICCIONES
- **ESMO**

Ciltacabtagene autoleucel

Ciltacabtagene autoleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido al menos un tratamiento previo, incluidos un agente inmunomodulador y un inhibidor del proteasoma, han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento y son refractarios a lenalidomida.

- RESTRICCIONES
- S ESMO

Zanubrutinib

Zanubrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido al menos una terapia previa o como tratamiento de primera línea en pacientes que no son aptos para quimioinmunoterapia.

- FINANCIACIÓN
 COMPLETA
- S ESMO

Teclistamab

Teclistamab está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.

- FINANCIACIÓN COMPLETA
- S ESMO

Talquetamab

Talquetamab está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, que han recibido al menos 3 tratamientos previos, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.



S ESMO

Elranatamab

Elranatamab está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38, y que han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.



