

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Enfermedad de Hodgkin

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Enfermedad de Hodgkin

Pembrolizumab	<p>Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos a partir de 3 años de edad con linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario, que no han respondido a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) o después de al menos dos tratamientos previos cuando el TAPH no es una opción de tratamiento.</p>	 SIN FINANCIACIÓN  ESMO
Brentuximab vedotin	<p>Brentuximab Vedotin está indicado para pacientes adultos con linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ en estadio III o IV sin tratamiento previo en combinación con doxorubicina, vinblastina y dacarbacina (AVD). Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LH CD30+ con mayor riesgo de recaída o progresión después de un trasplante autólogo de células madre (TACM). Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LH CD30+ en recaída o refractario: 1. después de TACM o 2. después de al menos dos tratamientos previos cuando el trasplante autólogo de células madre o la poliquimioterapia no es una opción terapéutica.</p>	 RESTRICCIONES  ESMO
Nivolumab	<p>Nivolumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico (LHc) en recaída o refractario después de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) y de tratamiento con brentuximab vedotina.</p>	 FINANCIACIÓN COMPLETA  ESMO