

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Leucemia mieloide crónica

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Leucemia mieloide crónica

Asciminib

Asciminib is indicated for the treatment of adult patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukaemia in chronic phase (Ph+ CML-CP) previously treated with two or more tyrosine kinase inhibitors.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Bosutinib

Bosutinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con: - Leucemia mieloide crónica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+) en fase crónica (FC) recién diagnosticada, - LMC Ph+ en FC, fase acelerada (FA) o fase blástica (FB) tratados previamente con uno o más inhibidores de la tirosina quinasa [TKI(s), por sus siglas en inglés] y para quienes imatinib, nilotinib y dasatinib no se consideran opciones adecuadas de tratamiento.

 **FINANCIACIÓN COMPLETA**

 **ESMO**

Ponatinib

Ponatinib está indicado en pacientes adultos con leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica, fase acelerada o fase blástica que sean resistentes a dasatinib o nilotinib; que sean intolerantes a dasatinib o nilotinib y en los que no esté clínicamente indicado el tratamiento subsiguiente con imatinib; o que presenten la mutación T315I.

 **FINANCIACIÓN COMPLETA**

 **ESMO**