

## Lista de terapias

**Frase de búsqueda:** Leucemia mieloide aguda

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

### Leucemia mieloide aguda

#### **Gemtuzumab ozogamicin**

Gemtuzumab Ozogamicin está indicado para el tratamiento combinado con daunorubicina (DNR) y citarabina (AraC) en el tratamiento de pacientes a partir de los 15 años de edad con leucemia mieloide aguda (LMA) CD-33 positiva de novo no tratada previamente, excepto la leucemia promielocítica aguda (LPA).

 **RESTRICCIONES**  
 **ESMO**

#### **Daunorubicin / cytarabine**

Daunorubicin / cytarabine está indicado para el tratamiento en adultos de leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento (LMA-t) o LMA con cambios relacionados con mielodisplasia (LMA-CRMD), de diagnóstico reciente.

 **RESTRICCIONES**  
 **ESMO**

#### **Gilteritinib**

Gilteritinib está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria con mutación FLT3.

 **RESTRICCIONES**  
 **ESMO**



#### **Venetoclax**

Venetoclax, en combinación con un agente hipometilante, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) de nuevo diagnóstico que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva.

 **RESTRICCIONES**  
 **ESMO**

#### **Decitabine**

Decitabine está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda (LMA) de novo o secundaria, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no son candidatos a quimioterapia de inducción convencional.

 **FINANCIACIÓN  
COMPLETA**  
 **ESMO**

## Midostaurin

Midostaurin está indicado para pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) de nuevo diagnóstico con mutación FLT3, en combinación con la quimioterapia estándar de inducción (daunorubicina y citarabina) y de consolidación (altas dosis de citarabina) seguido de un tratamiento de mantenimiento en monoterapia con Midostaurin en pacientes que hayan alcanzado respuesta completa.



**FINANCIACIÓN  
COMPLETA**



**ESMO**