

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Leucemia mieloide aguda

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Leucemia mieloide aguda

Gemtuzumab ozogamicin

Gemtuzumab Ozogamicin está indicado para el tratamiento combinado con daunorubicina (DNR) y citarabina (AraC) en el tratamiento de pacientes a partir de los 15 años de edad con leucemia mieloide aguda (LMA) CD-33 positiva de novo no tratada previamente, excepto la leucemia promielocítica aguda (LPA).

 **RESTRICCIONES**
 **ESMO**

Daunorubicin / cytarabine

Daunorubicin / cytarabine está indicado para el tratamiento en adultos de leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento (LMA-t) o LMA con cambios relacionados con mielodisplasia (LMA-CRMD), de diagnóstico reciente.

 **RESTRICCIONES**
 **ESMO**

Gilteritinib

Gilteritinib está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria con mutación FLT3.

 **RESTRICCIONES**
 **ESMO**

Venetoclax

Venetoclax, en combinación con un agente hipometilante, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) de nuevo diagnóstico que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva.

 **RESTRICCIONES**
 **ESMO**

Decitabine

Decitabine está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda (LMA) de novo o secundaria, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no son candidatos a quimioterapia de inducción convencional.

 **FINANCIACIÓN
COMPLETA**
 **ESMO**

Midostaurin

Midostaurin está indicado para pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) de nuevo diagnóstico con mutación FLT3, en combinación con la quimioterapia estándar de inducción (daunorubicina y citarabina) y de consolidación (altas dosis de citarabina) seguido de un tratamiento de mantenimiento en monoterapia con Midostaurin en pacientes que hayan alcanzado respuesta completa.

 **FINANCIACIÓN
COMPLETA**

 **ESMO**