

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Linfomas no Hodgkin

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Linfomas no Hodgkin

Obinutuzumab	<p>Obinutuzumab en combinación con quimioterapia seguido de Obinutuzumab en terapia de mantenimiento en pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF avanzado no tratados previamente. Obinutuzumab en combinación con bendamustina seguido de Obinutuzumab en mantenimiento, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF que no han respondido o han progresado durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un régimen con rituximab.</p>	 SIN FINANCIACIÓN  ESMO
Lenalidomide	<p>Lenalidomide en combinación con rituximab (anticuerpo anti-CD20) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos que han recibido tratamiento previo para el linfoma folicular (Grado 1-3a). Lenalidomide en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario.</p>	 RESTRICCIONES  ESMO
Brentuximab vedotin	<p>Brentuximab Vedotin, en combinación con ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona (CHP), está indicado para pacientes adultos con linfoma anaplásico de células grandes sistémico (LACGs) sin tratamiento previo. Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LACGs en recaída o refractario. Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma cutáneo de células T (LCCT) CD30+ tras, al menos, un tratamiento sistémico previo.</p>	 RESTRICCIONES  ESMO

Temsirolimus

Temsirolimus está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída y/o resistente al tratamiento.

✓ **FINANCIACIÓN
COMPLETA**

✓ **ESMO**

Idelalisib

Idelalisib está indicado en monoterapia para el tratamiento de los pacientes adultos con linfoma folicular (LF) refractario a dos líneas de tratamiento anteriores.

✓ **FINANCIACIÓN
COMPLETA**

✓ **ESMO**

Ibrutinib

Ibrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario.

✓ **FINANCIACIÓN
COMPLETA**

✓ **ESMO**