

Lista de terapias

Frase de búsqueda: Linfomas no Hodgkin

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Linfomas no Hodgkin

Obinutuzumab

Obinutuzumab en combinación con quimioterapia seguido de Obinutuzumab en terapia de mantenimiento en pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF avanzado no tratados previamente. Obinutuzumab en combinación con bendamustina seguido de Obinutuzumab en mantenimiento, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF que no han respondido o han progresado durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un régimen con rituximab.

 **SIN FINANCIACIÓN**
 **ESMO**

Loncastuximab tesirine

Loncastuximab tesirine está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma B de alto grado (LBAG), en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.

 **SIN FINANCIACIÓN**
 **ESMO**

Zanubrutinib

Zanubrutinib en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) refractario o recaída que han recibido al menos dos tratamientos sistémicos previos.

 **SIN FINANCIACIÓN**
 **ESMO**

Odronextamab

Odronextamab como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes en recaída o refractario (LBDCG R/R) después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.

 **SIN FINANCIACIÓN**
 **ESMO**

Acalabrutinib

Acalabrutinib en combinación con bendamustina y rituximab (BR) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) no tratados previamente y que no son candidatos a trasplante autólogo de células madre (TAPH).

Acalabrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario que no hayan sido tratados previamente con un inhibidor de BTK.

 SIN FINANCIACIÓN

 ESMO

Ibrutinib

Ibrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario.

 RESTRICCIONES

 ESMO

Lenalidomide

Lenalidomide en combinación con rituximab (anticuerpo anti-CD20) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos que han recibido tratamiento previo para el linfoma folicular (Grado 1-3a). Lenalidomide en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario.

 RESTRICCIONES

 ESMO

Axicabtagene ciloleucel

Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL) that relapses within 12 months from completion of, or is refractory to, first-line chemoimmunotherapy. Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) DLBCL and primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBCL), after two or more lines of systemic therapy. Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with r/r follicular lymphoma (FL) after three or more lines of systemic therapy.

 RESTRICCIONES

 ESMO

Tisagenlecleucel

Tisagenlecleucel está indicado en el tratamiento de: - Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos. - Linfoma folicular (LF) en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos.

 RESTRICCIONES

 ESMO

Polatuzumab vedotin

Polatuzumab vedotina en combinación con rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, y prednisona (R-CHP) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) que no han recibido tratamiento previo. Polatuzumab vedotina en combinación con bendamustina y rituximab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o /refractario que no sean candidatos a un trasplante de células madre hematopoyéticas.

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Brexucabtagene autoleucel

Mantle cell lymphoma Brexucabtagene autoleucel is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL) after two or more lines of systemic therapy including a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor.

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Tafasitamab

Tafasitamab en combinación con lenalidomida, seguido de MINJUVI en monoterapia, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de linfocitos B grandes (DLBCL) recidivante o resistente al tratamiento que no son aptos para trasplante autólogo de células madre (TACM).

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Lisocabtagene maraleucel

Lisocabtagene maraleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG), linfoma de células B de alto grado (LCBAG), linfoma B primario mediastínico de células grandes (LBPM) y linfoma folicular de grado 3B (LF3B) que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a la misma. Lisocabtagene maraleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LBDCG, LBPM y LF3B en recaída o refractarios, después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Epcoritamab

Epcoritamab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after two or more lines of systemic therapy. Epcoritamab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy.

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Pirtobrutinib

Pirtobrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario que hayan sido tratados previamente con un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK).

-  **RESTRICCIONES**
-  **ESMO**

Mosunetuzumab

Mosunetuzumab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) who have received at least two prior systemic therapies.



**FINANCIACIÓN
COMPLETA**



ESMO

Glofitamab

Glofitamab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), after two or more lines of systemic therapy.



**FINANCIACIÓN
COMPLETA**



ESMO