



### Lista de terapias

Frase de búsqueda: Linfomas no Hodgkin

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

# Linfomas no Hodgkin

Obinutuzumab en combinación con quimioterapia seguido de Obinutuzumab en terapia de mantenimiento en pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF avanzado no tratados previamente. Obinutuzumab en combinación con bendamustina seguido de Obinutuzumab en mantenimiento, está indicado para el tratamiento de pacientes con LF que no han respondido o han progresado durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un régimen con rituximab.





# Lisocabtagene

maraleucel

**Obinutuzumab** 

Lisocabtagene maraleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG), linfoma de células B de alto grado (LCBAG), linfoma B primario mediastínico de células grandes (LBPM) y linfoma folicular de grado 3B (LF3B) que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a la misma. Lisocabtagene maraleucel está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LBDCG, LBPM y LF3B en recaída o refractarios, después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.





#### Loncastuximab tesirine está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B IN FINANCIACIÓN Loncastuximab difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma B de alto tesirine grado (LBAG), en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico. Glofitamab as monotherapy is indicated for the treatment SIN FINANCIACIÓN of adult patients with relapsed or refractory diffuse large **Glofitamab** B-cell lymphoma (DLBCL), after two or more lines of systemic therapy. Zanubrutinib en combinación con obinutuzumab está SIN FINANCIACIÓN indicado para el tratamiento de pacientes adultos con Zanubrutinib linfoma folicular (LF) refractario o recaída que han recibido al menos dos tratamientos sistémicos previos. Odronextamab como monoterapia está indicado para el SIN FINANCIACIÓN tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de **Odronextamab** células grandes en recaída o refractario (LBDCG R/R) **ESMO** después de dos o más líneas de tratamiento sistémico. Aacalabrutinib en combinación con bendamustina y rituximab (BR) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) no tratados previamente y que no son candidatos a SIN FINANCIACIÓN **Acalabrutinib** trasplante autólogo de células madre (TAPH). Aacalabrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario que no hayan sido tratados previamente con un inhibidor de BTK. Ibrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento **RESTRICCIONES Ibrutinib** de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario. Lenalidomide en combinación con rituximab (anticuerpo anti-CD20) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos que han recibido tratamiento previo para el RESTRICCIONES Lenalidomide linfoma folicular (Grado 1-3a). Lenalidomide en monoterapia está indicado para el tratamiento de

pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM)

en recaída o refractario.

# **Axicabtagene** ciloleucel

Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL) that relapses within 12 months from completion of, or is refractory to, first-line chemoimmunotherapy. Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) DLBCL and primary mediastinal large Bcell lymphoma (PMBCL), after two or more lines of systemic therapy. Axicabtagene ciloleucel is indicated for the treatment of adult patients with r/r follicular lymphoma (FL) after three or more lines of systemic therapy.

- RESTRICCIONES

**Tisagenlecleucel** 

Tisagenlecleucel está indicado en el tratamiento de: -Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos. - Linfoma folicular (LF) en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos.

- RESTRICCIONES

# **Polatuzumab** vedotin

Polatuzumab vedotina en combinación con rituximab. ciclofosfamida, doxorubicina, y prednisona (R-CHP) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con lifoma B difuso de células grandes (LBDCG) que no han recibido tratamiento previo. Polatuzumab vedotina en combinación con bendamustina y rituximab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o /refractario que no sean candidatos a un trasplante de células madre hematopoyéticas.

- RESTRICCIONES

## **Brexucabtagene** autoleucel

Mantle cell lymphoma Brexucabtagene autoleucel is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL) after two or more lines of systemic therapy including a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor.

- **RESTRICCIONES**

Epcoritamab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after two or more lines of systemic therapy. Epcoritamab as monotherapy is

indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy.

#### **Epcoritamab**

Pirtobrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células

quinasa de Bruton (BTK).

RESTRICCIONES

RESTRICCIONES

**Pirtobrutinib** 

del manto (LCM) en recaída o refractario que hayan sido tratados previamente con un inhibidor de la tirosina

#### **Tafasitamab**

Tafasitamab en combinación con lenalidomida, seguido de MINJUVI en monoterapia, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de linfocitos B grandes (LDLBG) recidivante o resistente al tratamiento que no son aptos para trasplante autólogo de células madre (TACM).





Mosunetuzumab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory Mosunetuzumab follicular lymphoma (FL) who have received at least two prior systemic therapies.



