

Lista de terapias

Frase de búsqueda: trastuzumab deruxtecan

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Cáncer de estómago

Trastuzumab deruxtecan	Trastuzumab Deruxtecan en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2-positivo avanzado que han recibido una pauta previa con trastuzumab.	SIN FINANCIACIÓN ESMO

Cáncer de colon y recto

Trastuzumab deruxtecan	Otros tumores sólidos no resecables o metastásicos Trastuzumab deruxtecán en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con tumores sólidos HER2-positivos (IHC 3+) no resecables o metastásicos que han recibido tratamiento previo y que no disponen de opciones terapéuticas satisfactorias.	SIN FINANCIACIÓN ESMO

Cáncer de tráquea, pulmón y bronquios

Trastuzumab deruxtecan	Trastuzumab Deruxtecan en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado cuyos tumores tienen una mutación activadora de HER2 (ERBB2) y requieren tratamiento sistémico tras la quimioterapia basada en platino con o sin inmunoterapia.	SIN FINANCIACIÓN ESMO

Cáncer de mama

Trastuzumab deruxtecan	Trastuzumab Deruxtecan en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama HER2-positivo no resecable o metastásico que han recibido una o más pautas previas dirigidas a HER2. Trastuzumab Deruxtecan como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama con baja expresión de HER2 no resecable o metastásico que han recibido quimioterapia previa en el contexto metastásico o han desarrollado recurrencia de la enfermedad durante o en los 6 meses siguientes a la finalización de la quimioterapia adyuvante.	RESTRICCIONES ESMO