# Lista de terapias

**Frase de búsqueda:** daratumumab

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

## Mieloma múltiple y neoplasias de células plasmáticas

| | | |
|---|---|---|
| **Daratumumab** | Mieloma múltiple Daratumumab está indicado: - en combinación con lenalidomida y dexametasonao con bortezomib, melfalán y prednisona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que no son candidatos a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. - en combinación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico. - en combinación con bortezomib, talidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que son candidatos a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. - en combinación con lenalidomida y dexametasona, o bortezomib y dexametasona, para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos un tratamiento previo. - en combinación con pomalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido un tratamientopreviocontenciendo un inhibidor del proteasoma y lenalidomida y fuesenrefractariosa lenalidomida, o que hanrecibido al menos dos tratamientosprevios queincluyanlenalidomida y un inhibidor del proteasomay hayan presentado progresiónde la enfermedad durante o después del último tratamiento. - en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario al tratamiento, que hayan recibido previamente un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. Mieloma múltiple quiescente Daratumumab monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple quiescente con alto riesgo de desarrollar mieloma múltiple. | RESTRICCIONES<br>ESMO |