

Lista de terapias

Frase de búsqueda: brentuximab vedotin

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Enfermedad de Hodgkin

Brentuximab vedotin

Brentuximab Vedotin está indicado para pacientes adultos con linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ en estadio III o IV sin tratamiento previo en combinación con doxorubicina, vinblastina y dacarbacina (AVD). Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LH CD30+ con mayor riesgo de recaída o progresión después de un trasplante autólogo de células madre (TACM). Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LH CD30+ en recaída o refractario: 1. después de TACM o 2. después de al menos dos tratamientos previos cuando el trasplante autólogo de células madre o la poliquimioterapia no es una opción terapéutica.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**

Linfomas no Hodgkin

Brentuximab vedotin

Brentuximab Vedotin, en combinación con ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona (CHP), está indicado para pacientes adultos con linfoma anaplásico de células grandes sistémico (LACGs) sin tratamiento previo. Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LACGs en recaída o refractario. Brentuximab Vedotin está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma cutáneo de células T (LCCT) CD30+ tras, al menos, un tratamiento sistémico previo.

 **RESTRICCIONES**

 **ESMO**