[redacted]

Lista de terapias

Frase de búsqueda: durvalumab

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

Durvalumab	Carcinoma hepatocelular (CHC) Durvalumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable. Durvalumab en combinación con tremelimumab está indicado para eltratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable.	RESTRICCIONES ESMO

Cáncer de tráquea, pulmón y bronquios

Durvalumab	Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) Durvalumab en combinación con quimioterapia basada en platino como tratamiento neoadyuvante, seguido de IMFINZI en monoterapia como tratamiento adyuvante, está indicado en adultos para el tratamiento del CPNM resecable con alto riesgo de recurrencia y sin mutaciones de EGFR o reordenamientos de ALK. Durvalumab en monoterapia está indicado en adultos para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado, no resecable, cuyos tumores expresan PD-L1 ≥ 1% en las células tumorales y cuya enfermedad no haya presentado progresión después de quimiorradioterapia basada en platino. Durvalumab en combinación con tremelimumab y quimioterapia basada en platino está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con CPNM metastásico sin mutaciones sensibilizantes de EGFR o mutaciones ALK positivas. Cáncer de pulmón microcítico (CPM) Durvalumab en monoterapia está indicado en adultos para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico en estadio limitado (CPM-EL) cuya enfermedad no haya presentado progresión después de quimiorradioterapia basada en platino. Durvalumab en combinación con etopósido y carboplatino o cisplatino está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido (CPM-EE).	RESTRICCIONES ESMO

Cáncer de vejiga

Durvalumab	Cáncer de vejiga músculo invasivo (CVMI) Durvalumab en combinación con gemcitabina y cisplatino como tratamiento neoadyuvante, seguido de Durvalumab en monoterapia como tratamiento adyuvante después de la cistectomía radical, está indicado para el tratamiento de adultos con cáncer de vejiga músculo invasivo (CVMI) resecable.	FINANCIACIÓN COMPLETA ESMO