






SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU:

## Chłoniaki nieziarnicze rozlane

OBEJMUJE M.IN. CHŁONIAKA DLBCL ORAZ CHŁONIAKA Z KOMÓREK PŁASZCZA

Nazwa substancji czynnej	Czy występuje w standardzie ESMO?	Status refundacji	Dodatkowe informacje
Ibrutinib		Brak refundacji	<p>Produkt leczniczy ibrutinib w monoterapii jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszczka (ang. mantle cell lymphoma, MCL).</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/imbruvica-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/imbruvica-epar-product-information_pl.pdf</a></p>
Tisagenlecleucel		Brak refundacji	<p>Tisagenlecleucel jest lekiem stosowanym w leczeniu: - chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) u osób dorosłych, u których nastąpił nawrót choroby lub którzy nie reagowali na leczenie po dwóch lub większej liczbie wcześniejszych terapii.</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/kymriah-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/kymriah-epar-product-information_pl.pdf</a></p>
Axicabtagene ciloleucel		Brak refundacji	<p>Produkt axicabtagene ciloleucel jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (ang. primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL) u dorosłych pacjentów, którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/yescarta-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/yescarta-epar-product-information_pl.pdf</a></p>

Nazwa substancji czynnej	Czy występuje w standardzie ESMO?	Status refundacji	Dodatkowe informacje
Nelarabine		Pełna refundacja	<p>Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (T-ALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii. Ze względu na niewielką populację pacjentów z tymi schorzeniami informacje dotyczące stosowania w tych wskazaniach oparte są na ograniczonych danych.</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/atricane-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/atricane-epar-product-information_pl.pdf</a></p> <p>Program lekowy:  <a href="https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r">https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r</a></p>
Lenalidomide		Brak refundacji	<p>Produkt lenalidomide w monoterapii wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszczka.</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/revlimid-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/revlimid-epar-product-information_pl.pdf</a></p>
Temsirolimus		Brak refundacji	<p>Temsirolimus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym i (lub) opornym chłoniakiem z komórek płaszczka (MCL, ang. mantle cell lymphoma)</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/torisel-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/torisel-epar-product-information_pl.pdf</a></p>

Nazwa substancji czynnej	Czy występuje w standardzie ESMO?	Status refundacji	Dodatkowe informacje
Bortezomib		Pełna refundacja	<p>Produkt leczniczy bortezomib w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszczka, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/velcade-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/velcade-epar-product-information_pl.pdf</a></p> <p>Program lekowy:  <a href="https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r">https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r</a></p>
Pixantrone dimaleate		Refundacja z ograniczeniami	<p>Produkt pixantrone dimaleate jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu wielokrotnie nawracającego lub opornego na leczenie, agresywnego chłoniaka nieziarniczego z komórek B (ang. Non-Hodgkin Lymphoma, NHL) u osób dorosłych. Nie udowodniono korzyści z leczenia piksantronem stosowanym w piątej lub dalszej linii chemioterapii u pacjentów z opornością na ostatnio stosowane leczenie.</p> <p>EPAR/ChPL:  <a href="https://www.ema.europa.eu/document/information/pixuvri-epar-product-information_pl.pdf">https://www.ema.europa.eu/document/information/pixuvri-epar-product-information_pl.pdf</a></p> <p>Program lekowy:  <a href="https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r">https://www.gov.pl/web/zdrowie/obw-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r</a></p>