

Zestawienie substancji lekowych

Wyszukiwana fraza: Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Lenvatinib	Lenvatinib w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie byli poddani wcześniej leczeniu ogólnemu.	BRAK REFUNDACJI ESMO
Regorafenib	Regorafenib jest wskazany w monoterapii do leczenia dorosłych pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular carcinoma, HCC), którzy wcześniej byli leczeni sorafenibem.	REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI ESMO
Cabozantinib	Cabozantinib w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych uprzednio leczonych sorafenibem.	REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI ESMO
Ramucirumab	Ramucirumab jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomówkowym leczonych uprzednio sorafenibem, u których stężenie alfa fetoproteiny (AFP) w surowicy wynosi ≥400 ng/ml.	REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI ESMO

Atezolizumab	Atezolizumab, w skojarzeniu z bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular carcinoma, HCC), którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia systemowego.	REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI ESMO
Durvalumab	Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Durvalumab w monoterapiijest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u osób dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC). Durvalumab w skojarzeniu z tremelimumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).	REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI ESMO
Tremelimumab	Tremelimumab w skojarzeniu z durwalumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular cancer, HCC).	PEŁNA REFUNDACJA ESMO
Ipilimumab	Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Ipilimumab w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego lub zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego u dorosłych pacjentów.	PEŁNA REFUNDACJA ESMO
Nivolumab	Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Nivolumab w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego lub zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego u dorosłych pacjentów.	PEŁNA REFUNDACJA ESMO