

## Zestawienie substancji lekowych

**Wyszukiwana fraza:** Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

### Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

#### Lenvatinib

Lenvatinib w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie byli poddani wcześniej leczeniu ogólnemu.

 **BRAK REFUNDACJI**

 **ESMO**

#### Tremelimumab

Tremelimumab w skojarzeniu z durwalumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular cancer, HCC).

 **BRAK REFUNDACJI**

 **ESMO**

#### Regorafenib

Regorafenib jest wskazany w monoterapii do leczenia dorosłych pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular carcinoma, HCC), którzy wcześniej byli leczeni sorafenibem.

 **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

 **ESMO**

#### Cabozantinib

Cabozantinib w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych uprzednio leczonych sorafenibem.

 **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

 **ESMO**

#### Ramucirumab

Ramucirumab jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym leczonych uprzednio sorafenibem, u których stężenie alfa fetoproteiny (AFP) w surowicy wynosi  $\geq 400$  ng/ml.

 **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

 **ESMO**

## Atezolizumab

Atezolizumab, w skojarzeniu z bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular carcinoma, HCC), którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia systemowego.

 **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

 **ESMO**

## Durvalumab

Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Durvalumab w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u osób dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC). Durvalumab w skojarzeniu z tremelimumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).

 **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

 **ESMO**

## Ipilimumab

Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Ipilimumab w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego lub zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego u dorosłych pacjentów.

 **PEŁNA REFUNDACJA**

 **ESMO**

## Nivolumab

Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) Nivolumab w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego lub zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego u dorosłych pacjentów.

 **PEŁNA REFUNDACJA**

 **ESMO**