

Zestawienie substancji lekowych

Wyszukiwana fraza: cabozantinib

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Cabozantinib

Cabozantinib w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych uprzednio leczonych sorafenibem.



**REFUNDACJA Z
OGNICZENIAMI**



ESMO

Rak nerki

Cabozantinib

Cabozantinib w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC): - jako pierwsza linia leczenia dorosłych pacjentów z grupy pośredniego lub niekorzystnego ryzyka, - u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Cabozantinib w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u dorosłych pacjentów.



**REFUNDACJA Z
OGNICZENIAMI**



ESMO