



Zestawienie substancji lekowych

Wyszukiwana fraza: tisagenlecleucel

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Chłoniaki nie-Hodgkina

Tisagenlecleucel jest wskazany w leczeniu: - Dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), po **Tisagenlecleucel** dwóch lub większej liczbie linii leczenia systemowego. - Dorosłych pacjentów z chłoniakiem grudkowym (ang. follicular lymphoma, FL) po dwóch lub większej liczbie linii leczenia.

! **REFUNDACJA Z OGRANICZENIAMI**

✓ **ESMO**

Ostra białaczka limfoblastyczna

Tisagenlecleucel jest wskazany w leczeniu dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku do 25 lat włącznie, z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B, **Tisagenlecleucel** oporną na leczenie, która znajduje się w fazie nawrotu po transplantacji lub w fazie drugiego bądź kolejnego nawrotu.

✓ **PEŁNA REFUNDACJA**

✓ **ESMO**